

55. 引起肝颈静脉回流征阳性的常见病症是  
 A. 肝功能衰竭                      B. 下腔静脉阻塞                      C. 门脉高压症  
 D. 左侧胸腔积液                      E. 右心衰竭
56. 男,40岁。发现高血压半年。查体时于脐部偏右上闻及血管杂音。最可能的诊断是  
 A. 主动脉夹层                      B. 原发性肝癌                      C. 缺血性肠病  
 D. 肾动脉狭窄                      E. 门静脉血栓
57. 肺气肿患者可能出现的体征是  
 A. 双肺语颤增强                      B. 肺部叩诊呈鼓音                      C. 心界向两侧扩大  
 D. 肝上界下移                      E. 双侧肋间隙变窄
58. 女,54岁。健康查体:肝脏于剑突下1.5cm可触及,质地如触口唇,无触痛。最可能的情况是  
 A. 肝脓肿                      B. 慢性肝炎                      C. 肝瘀血  
 D. 肝左叶癌                      E. 正常肝脏
59. 腹部移动性浊音不正确的检查方法是  
 A. 受检者首先需采取平卧位                      B. 自腹中部沿脐水平面叩诊  
 C. 叩诊音变浊音后改变体位                      D. 变换体位后继续原方向叩诊  
 E. 变换体位时板指不应移动
60. Brudzinski征阳性的表现是  
 A. 踮趾背伸四趾屈曲                      B. 伸膝受阻伴疼痛                      C. 股四头肌收缩  
 D. 颈部抵抗增强                      E. 髌及膝关节屈曲
61. 引起左锁骨上窝淋巴结肿大的常见病症是  
 A. 气管炎                      B. 结肠癌                      C. 骨髓炎  
 D. 食管炎                      E. 食管癌
62. 男,48岁。近期健康体检报告示:血BUN 6.0 mmol/L,总胆红素 12.7  $\mu$ mol/L,AST 72 U/L,空腹血糖 6.0 mmol/L,总胆固醇 7.5 mmol/L。临床的诊断是  
 A. 糖尿病伴肾功能不全                      B. 糖尿病伴血脂异常                      C. 肝功能异常伴血脂异常  
 D. 肝功能衰竭伴黄疸                      E. 肾功能不全伴黄疸
63. 女,30岁。寒战、发热4天。查体:右侧肋脊点、肋腰点压痛阳性。首选的辅助检查是  
 A. 结肠镜                      B. 腹部B超                      C. 肾功能  
 D. 尿常规                      E. 粪便常规
64. 某心悸患者查体所见:脉搏89次/分,心率113次/分,心律绝对不齐。最可能的诊断是  
 A. 房性早搏                      B. 室性早搏                      C. 室上性心动过速  
 D. 心室颤动                      E. 心房颤动
65. 某胸痛患者的心电图示:II、III、aVF导联ST段抬高,T波倒置,病理Q波形成。最可能的诊断是  
 A. 变异型心绞痛                      B. 急性心包炎                      C. 急性肺栓塞  
 D. 急性心肌梗死                      E. 肥厚型梗阻性心肌病
66. 女,32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果为:比重1.018,蛋白27g/L,WBC  $600 \times 10^6/L$ ,L 0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是  
 A. 恶性腹水                      B. 结核性腹膜炎                      C. 化脓性腹膜炎  
 D. 肝硬化腹水                      E. 自发性细菌性腹膜炎
67. 不属于丹毒临床表现的是  
 A. 畏寒、发热                      B. 头痛、全身不适                      C. 多见于下肢  
 D. 皮肤和淋巴结多见化脓破溃                      E. 局部烧灼样疼痛